



Maladie de Still à révélation tardive

Frikha.O ; Mekki.S ; Ghribi.M ; Snoussi.M ; Marzouk.S ; Bahloul.Z

Service de Médecine Interne, CHU Hédi Chaker, Sfax.

QR CODE

Introduction :

La maladie de Still de l'adulte (MSA) est une maladie auto inflammatoire rare. Elle touche l'adulte jeune entre 16 et 35 ans. Sa survenue à un âge supérieur à 50 ans est rare. Nous nous intéressons dans notre étude aux cas à révélation tardive.

Matériels et méthodes :

Il s'agit d'une étude rétrospective menée dans notre service entre 1996 et 2018. Nous avons colligé 65 cas de MSA.


Résultats :

La MSA a débuté tardivement chez 12 patients, soit 18.4% des cas.

Il s'agissait de 11 femmes et un homme.

Age moyen: 57 ans (extrêmes :50 -70 ans).

Fréquence des manifestations cliniques selon le sexe



Des arthrites ont été notées dans les 2/3 des cas.

Sur le plan biologique:

- une hyperleucocytose supérieure à 10 000 Eit/l (75%). Elle était supérieure à 15 000 Eit/l dans les 2/3 des cas.
- Les polynucléaires neutrophiles excédaient les 80% chez la moitié des malades.
- Le syndrome inflammatoire biologique constant:
 - * La CRP > 100 dans 7 cas (58.3%).
 - * La VS > 100 dans 9 cas (75%).
- Une hyperferritinémie chez 11 patients (91.7%).

Elle était supérieure à 5 fois la normale dans 83.3% des cas.

- Une atteinte hépatique (50% des cas):

* une cytolysse (25%)

* et /ou une cholestase (25%)

Sur le plan thérapeutique:

Tous les patients ont été traités par une corticothérapie à forte dose avec une durée d'attaque moyenne de 6 semaines.

Le méthotrexate a été prescrit en 2^{ème} intention dans la moitié des cas devant les rechutes fréquentes (5 cas) et la cortico-dépendance (1 cas).

Evolution:

- une forme systémique: 8 patients (66.7%) dont 5 (41.7%) ont présenté une forme monocyclique.
- une forme articulaire chronique: 4 patients (33,33%)

Des complications, survenues chez 5 malades (41.7%):

- hypertension artérielle (1 cas)
- ostéoporose (3 cas)
- obésité (1 cas)
- complications infectieuses (2 cas) dont une était décédée par état de choc septique

Discussion:

Dans la littérature, quelques études ont montré que le sexe féminin, les éruptions cutanées atypiques, la pleurésie, des taux élevés de ferritine et les complications sont plus fréquentes et que le taux de survie est moindre.

Dans notre étude, il n'y avait pas de différence significative par rapport à celle de l'adulte.

Conclusion :

La MSA à révélation tardive est devenue de plus en plus fréquente. Jusqu'à présent, il n'y a pas de différence significative démontrée par rapport de celle de l'adulte. Des études ultérieures à ce propos seraient nécessaires.