



## Insuffisance surrénalienne aiguë révélant un lymphome

### surrénalien primitif bilatéral : à propos d'un cas.

I. Chaabene ,I. Saoud ,M. Kechida , S. Daada ,S. Hammami ,R. Klii  
,Khochtali

Service de médecine interne et d'endocrinologie, CHU Fattouma  
Bourguiba Monastir, Tunisie

QR CODE

#### Introduction :

La localisation lymphomateuse des surrénales est le plus souvent secondaire à un lymphome non hodgkinien mais peut être exceptionnellement primitive.

Nous rapportons le cas d'un lymphome surrénalien primitif bilatéral découvert dans le cadre d'une insuffisance surrénale aiguë.

#### Observation :

Il s'agit d'un patient âgé de 53 ans, qui a été hospitalisé dans notre service dans un tableau d'insuffisance surrénalienne aiguë clinique et biologique et confirmée par une cortisolémie de base effondrée. Ainsi un traitement substitutif par voie systémique a été instauré en urgence. L'évolution était rapidement favorable au bout de moins de 24h.

Une enquête étiologique a été par la suite entamée et montrait la présence de deux masses surrénaliennes bilatérales de rehaussement hétérogène comportant des plages de nécrose. Après avoir éliminé le diagnostic de phéochromocytome, par un dosage des métanéphrines et de nor-métanéphrines urinaires qui est revenu normal, une biopsie chirurgicale a été pratiquée et montrait à l'examen anatomopathologique un lymphome B à grandes cellules. Le bilan d'extension était négatif, permettant ainsi de retenir la localisation surrénalienne primitive de lymphome.

#### Discussion:

Le lymphome surrénalien constitue une entité rare. Les signes cliniques retrouvés sont généralement non spécifiques, dus essentiellement au syndrome tumoral. L'insuffisance surrénalienne est rapportée dans la moitié des cas. Le diagnostic positif repose sur la preuve histologique et le caractère primitif peut être retenu après un bilan d'extension négatif. Le pronostic reste sombre.