



Thrombose ovarienne: à propos de 5 cas.

Gira Gh, Saoud I, Daadaa S, Sassi A, Chaabane I, Klii R, Kechida M, Hammami S

Service de médecine interne et d'endocrinologie,
CHU Fattouma Bouguiba, Monastir, Tunisie

QR CODE

Introduction :

La thrombose veineuse ovarienne est une pathologie rare de siège insolite. Elle survient classiquement durant la période de grossesse ou en post partum mais qui peut cacher d'autres pathologies. L'objectif est de rappeler à travers ces 5 cas la diversité des étiologies.

Matériel et méthodes :

Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 6 patientes dans un service de médecine interne (CHU, Monastir) entre 2006 et 2022.



Résultats:

La moyenne d'âge était de 33 ans. Le mode de découverte était une douleur de l'hypocondre droit (HCD) (3), une douleur du flanc gauche (1), une TVP superficielle (1) et de découverte fortuite (1). (Tableau I)

Cas	Age	Antécédents	Mode de découverte	Étiologie
1	29	RAA	Douleur HCD, dyspnée	SAPL
2	54	LES, Sjögren, HTA, DT2	Douleur HCD	RPCa
3	37	RAS	Découverte fortuite	Idiopathique
4	33	ACFA, TVP du MIG	TVP fém. superficielle	Déficit en PS
5	22	Lithiase rénale	Lombalgies gauches	Idiopathique
6	24	Maladie de B7	Douleur HCD	Maladie de B7

La veine ovarienne droite était atteinte dans 5 cas et une patiente présentait une thrombose bilatérale des veines ovariennes. Un cas s'est compliqué d'embolie pulmonaire segmentaire bilatérale avec infarctus pulmonaire.

Étiologies :



Conclusion :

Il s'agit d'une courte série qui dépeint la diversité étiologique des thromboses ovariennes, rappelant leur polymorphisme clinique et leur risque potentiel d'embolie pulmonaire.