



Les uvéites : quel impact sur la qualité de vie ?

QR CODE

Bouzi Mayssa Ben Achour Tayssir, Naceur Ines, Jridi Mayssem, Smiti Monia, Ben Ghorbel Imed, Lamoum Mounir, Said Fatma, Mohamed, Habib Houman,
Service de médecine interne, hôpital la Rabta, Tunis

Introduction

Les uvéites représentent une cause fréquente de baisse de l'acuité visuelle secondaire à une inflammation de l'uvée. Elles peuvent mettre en jeu le pronostic visuel et entraîner une cécité irréversible. Ainsi, elles sont susceptibles d'altérer la qualité de vie (QDV) des patients. Le but de notre travail est d'étudier l'influence de cette atteinte oculaire sur la QDV de nos patients.

Méthodologie

Etude transversale ayant inclus les patients se rendant à la consultation externe ou hospitalisés au service de médecine interne durant 2 mois (Aout–Septembre 2022). La qualité de vie a été évaluée par le **Visual Function Quality 25 (VFQ-25)**

Epidémiologie

Le tableau I résume les données épidémiologiques de notre série
La figure 1 résume les formes anatomiques des uvéites trouvées chez nos patients
La figure 2 résume les principales étiologies retrouvées chez nos patients

- panuvéite
- uvéite antérieure
- uvéite intermédiaire
- uvéite postérieure





Tableau I : Données épidémiologiques

Effectif	50
Age moyen	38
Genre ratio	1

Figure I : Formes anatomiques de l'uvéite



La **figure II** les principales étiologies retrouvées chez nos patients

Les domaines de la qualité de vie les plus altérés étaient : **la santé générale la vision générale la santé mentale**

Le **sexe masculin** et la **panuvéite** étaient associés à un score de qualité de vie plus bas.
Le **caractère bilatéral** et la **présence de complications** étaient corrélés à une altération de la qualité de vie dans la dimension de perception générale de la santé, la vision générale et la limitation du fonctionnement social.

Discussion-Conclusion

La majorité des études retrouvées dans la littérature ont prouvé l'impact de l'uvéite sur la qualité de vie des patients, ce qui concorde avec les résultats de notre travail, où la majorité des patients ont des scores médiocres témoignant de la souffrance physique et psychique, ceci peut être expliqué par la sévérité des symptômes et les comorbidités associées aux uvéites.

Cette altération est associée au caractère bilatéral, la présence de complications et au sexe masculin. Ainsi, une prise en charge globale tant sur le plan somatique que psychologique est indispensable afin d'améliorer la QDV de ces patients.