


## La Maladie Veineuse Thrombo-embolique



14 Octobre 2023

# MALADIE DE MONDOR : UNE FORME PARTICULIERE DES THROMBOSES VEINEUSES SUPERFICIELLES (P5)

M.roua, T.haifa, S.wafa, G.wafa, D.selma, L.manel, A.raja  
*Service de médecine interne HMTM Nabeul*



### Introduction:

La maladie de Mondor est une pathologie rare assimilée à une thrombophlébite des vaisseaux superficiels de localisation souvent thoracique ou abdominale.

Son diagnostic est clinique, son traitement est symptomatique ne nécessitant pas d'anticoagulation, mais la recherche de facteurs de risque comme la chirurgie mammaire, les néoplasies thoraciques ou la thrombophilie constitutionnelle s'impose.

A ce propos nous rapportons une nouvelle observation.

### Cas clinique:

Femme âgée de 69 ans hypertendue et diabétique qui a consulté pour l'apparition depuis une dizaine de jours de cordons sous cutanés indurés de couleur bleutée empruntant des trajets veineux superficiels au niveau de l'abdomen et remontant jusqu'à l'épigastre (figure1).



Figure1 : cordons sous cutanés indurés

Une échographie Doppler avait montré une dilatation variqueuse avec thrombose des veines épigastriques supérieures. Le bilan de thrombophilie constitutionnelle était négatif ainsi que les anti-phospholipides. Le diagnostic de maladie de Mondor était cliniquement évident. Une mammographie a été faite et n'a pas montré de lésion suspecte. L'angiomodensitométrie a révélé une atrophie de la veine cave inférieure sous rénale, les veines iliaques étaient également réduites de calibre et non opacifiées avec une dilatation de la grande veine azygos et des veines épigastriques superficielles

Ces lésions étaient radiologiquement en faveur d'une agénésie de la veine cave inférieure sous rénale plutôt qu'une thrombose associée à ce niveau. La patiente était traitée par héparine puis antivitamine K .conduite ajustée et la patiente était gardée sous traitement symptomatique à base d'antalgique et un traitement local à base d'une pommade anti-inflammatoire. L'évolution était favorable: diminution des cordons abdominaux et des douleurs au bout de 6 semaines. Une imagerie de contrôle est prévue au 6<sup>ème</sup> mois. Le recul actuel est de 5 ans avec une amélioration nette et l'absence de récurrence.

### Discussion et conclusion:

La MM survient sur veine saine et régresse spontanément.

Elle est idiopathique dans la moitié des cas, dans l'autre moitié elle peut être secondaire à une chirurgie mammaire ou un cancer du sein, à une thrombophilie constitutionnelle ou à un SAPL . La particularité de notre cas réside dans la rareté de la maladie, son caractère idiopathique et le fait qu'elle était la circonstance de découverte d'une autre pathologie rare qui l'agénésie de la veine cave inférieure sous rénale posant le diagnostic différentiel avec une thrombose ancienne à son niveau. Un bilan étiologique s'impose et le tt est symptomatique.