


La Maladie Veineuse Thrombo-embolique



14 Octobre 2023

Particularité des thromboses veineuses profondes chez les patients suivis en psychiatrie

Souha Khefifi, Imen Mariem Abbassi, Zeineb Teyeb, Mariem Essouri, Imen Oueslati, Asma Dorgham, Khaled Touati, Naziha Khammassi
Service de Médecine interne- Hôpital Razi

ADD YOUR
LOGOS HERE

Introduction:

Les causes des thromboses veineuses profondes (TVP) sont multifactorielles. Les patients suivis pour des troubles psychiatriques présentent plusieurs particularités étiologiques. Notre objectif était d'établir le lien entre les traitements spécifiques au milieu psychiatrique et la thrombogenèse.

Méthodes:

Étude rétrospective incluant les patients suivis et traités pour divers troubles psychiatriques ayant présenté au moins un accident thromboembolique veineux confirmé, menée sur une période de 5 ans (2018-2023).

Résultats:

Parmi 45 patients ayant présenté une TVP, 14 étaient suivis pour maladie psychiatrique dont 8 hommes et 6 femmes avec un sex-Ratio (H/F) à 1.33. L'âge moyen des malades était de 47 ans, avec des extrêmes de 28 et 77 ans. Le siège prédominant était au niveau des membres inférieurs (n=13 cas). Une embolie pulmonaire était objectivée dans un 1 cas. Les pathologies psychiatriques les plus fréquentes étaient : les troubles anxiodépressifs (n=5 cas), les épisodes dépressifs majeurs (n=2 cas), la schizophrénie (n=2 cas), les troubles schizo-affectifs (n=2 cas), les troubles bipolaires (n=2 cas) et les troubles psychotiques inclassables (n=1 cas). Six malades étaient sous neuroleptique (NLP) et cinq sous antidépresseurs au moment de l'accident thromboembolique. L'association NLP + antidépresseurs ou anxiolytique était observée chez 3 patients. Une contention au lit était prescrite chez 7 patients avec une durée d'immobilisation moyenne de 6 jours. Deux patients ont nécessité un séjour en unité de réanimation suite à une tentative de suicide, compliqué par un événement thromboembolique.

Conclusion:

La maladie veineuse thromboembolique en milieu psychiatrique se caractérise par l'association de facteurs de risque thromboemboliques relatifs à la pathologie psychiatrique elle-même, relatifs aux traitements à la tête desquels figurent les NLP, ainsi qu'aux procédés thérapeutiques spécifiques représentés essentiellement par la contention au lit et l'hypomobilité due aux molécules sédatives.