



Maladie veineuse thromboembolique de siège insolite

I. Ben Rouha; IM. Abbassi; Z. Teyeb; M. Essouri; K. Touati; A. Dorgham; N. Khammassi
Hôpital Razi, Manouba

ADD YOUR
LOGOS HERE

Introduction:

- La maladie veineuse thromboembolique (MVTE) de siège insolite nécessite toujours une enquête étiologique quel que soit le terrain à la recherche d'une cause sous-jacente qui conditionne la prise en charge et le suivi.
- Le but de notre travail était de décrire les particularités épidémiologiques, cliniques, étiologiques et évolutives des patients ayant présenté une MVTE de siège insolite.

Résultats:

- Sur 46 patients ayant présenté une MVTE, 6 thromboses (13%) étaient de siège insolite dont 3 hommes et 3 femmes. L'âge moyen au moment du diagnostic était de 41 ans [15-65 ans]. Deux patientes avaient un facteur de risque thrombotique: un contexte de post partum.
- Le siège de la thrombose était : jugulaire (n=3), une thrombophlébite cérébrale (n=1), une thrombose de la veine hépatique accessoire droite (n=1) et une thrombose de la veine ovarienne (n=1). L'enquête étiologique a révélé une cause néoplasique dans 2 cas à savoir une tumeur du cavum et une tumeur vésicale chez des patients âgés de 61 ans et de 65 ans respectivement. Un déficit en protéine S, une maladie de behçet, un sepsis et un lupus érythémateux systémique ont été diagnostiqués chacun dans 1 cas. Tous les patients ont été mis sous traitement anticoagulant sans complications hémorragiques ni récurrence. Deux patients ont été perdus de vue.
- Le traitement anticoagulant a été associé aux corticoïdes et aux immunosuppresseurs chez deux patients présentant un lupus érythémateux systémique et une maladie de behçet.

Conclusion:

- Nos explorations ont permis de retenir une étiologie à la MVTE chez tous les patients. L'étiologie la plus fréquente était l'origine néoplasique rejoignant ainsi les données de la littérature.