


La Maladie Veineuse Thrombo-embolique



14 Octobre 2023

thrombose veineuse: à propos de 335 cas

Bouzidi mayssa, service de médecine interne de l'Hopital Taher Maamouri, Nabeul
, service de médecine interne de l'Hopital Taher Maamouri, Nabeul
tounsi haifa, service de médecine interne de l'Hopital Taher Maamouri, Nabeul
garbouj wafa, service de médecine interne de l'Hopital Taher Maamouri, Nabeul
bachrouch sabrine
raja amri, service de médecine interne de l'Hopital Taher Maamouri, Nabeul



Introduction:

La maladie veineuse thromboembolique est une pathologie fréquente, elle est à l'origine d'une morbi-mortalité accrue. Le but de notre travail est d'étudier les caractéristiques cliniques et épidémiologiques des thromboses veineuses.

Patients et méthodes:

Il s'agit d'une étude rétrospective et descriptive incluant 335 patients hospitalisé par le biais des urgences au service de médecine interne de CHU Taher Maamouri Nabeul durant 10 ans (2008-2017).

Résultats:

Le tableau I: données épidémiologiques

Effectif	335
Age moyen	56,63 ans

- Les facteurs de risque** : l'**alitement** dans 21 % des cas, l'**antécédent de thrombose veineuse profonde** (TVP) dans 11% des cas et les **varices des deux membres** inférieurs dans 6% des cas. Soixante-deux pour cent des patients n'avaient aucun facteur de risque de MVTE.
- La thrombose veineuse profonde était notée dans 93% des cas.
- Les **membres inférieurs** étaient la **localisation la plus fréquente** (87,16%). La TVP était de siège insolite dans 12,7% des cas.
- Complications des TVP** : embolie pulmonaire dans 4,6% des cas et d'un syndrome post phlébitique dans 0,29% des cas.
- Une récurrence de TVP était notée dans 15% des cas.

Conclusion:

Malgré les progrès de la prophylaxie anti thrombotique, la TV reste une cause majeure de morbi mortalité d'étiologies diverses nécessitant une prise en charge rapide et adéquate.