

## Une histoire de thrombophilie constitutionnelle révélée tardivement

Rihem Boukhzar, Abir derbel, Raida Ben Salah, Mona Snoussi, Chifa Damak, Faten Frikha, Sameh Marzouk, Zouhir Bahloul  
Service de médecine interne, Hôpital Hedi Chaker, Sfax

### Introduction :

La maladie veineuse thromboembolique (MVTE) est une pathologie fréquente dont la pathogénie est multifactorielle. Ses étiologies sont multiples impliquant une enquête hiérarchisée et bien orientée selon plusieurs déterminants dont le sexe et l'âge. La survenue d'une MVTE peut être favorisée par des anomalies constitutionnelles de l'hémostase appelées thrombophilies constitutionnelles qui sont surtout l'apanage du sujet jeune.

### Observation:

Il s'agissait d'un patient âgé de 65 ans hypertendu. Il a présenté des douleurs abdominales diffuses paroxystiques dans un contexte d'apyrexie. L'examen et le bilan biologique étaient normaux. Un angioscanner abdominal a montré une thrombose de la veine mésentérique supérieure sans extension au tronc porte ni au tronc spléno-mésaraïque. Les marqueurs tumoraux étaient négatifs. Les anticorps antiphospholipides étaient négatifs. Devant le siège insolite, on a complété par la recherche de la mutation JAK 2 qui était négative. On a complété par le bilan de thrombophilie constitutionnelle qui a révélé un déficit en protéine S à 41% (valeur normale <55%) et la présence de la mutation G169 1H du facteur V Leiden à l'état hétérozygote. Les taux de la protéine C et l'anti thrombine III étaient par ailleurs normaux. Le patient a été traité par anti vitamine K avec bonne évolution clinique.

### Conclusion:

Le déficit en protéines de la coagulation, souvent l'apanage du sujet jeune, peut se voir aussi chez le sujet âgé d'où l'intérêt de le chercher.