

# Maladie veineuse thrombo-embolique associée aux affections hématologiques chez le sujet âgé

Kechaou I, Agoubi S, Ben El Haj W, Jebri M, Cherif E, Boukhris I, Azzabi S, Hamdi MS, Ben Hassine L  
Service de Médecine Interne B - Hôpital Charles Nicolle - Tunis - Tunisie



## INTRODUCTION

- Les complications vasculaires des affections hématologiques sont fréquentes, notamment les complications thrombo-emboliques.
- Le but de notre travail est d'établir le profil épidémiologique, clinique, et évolutif des complications thrombo-emboliques des affections hématologiques chez le sujet âgé.

## MÉTHODES


- étude descriptive rétrospective menée entre 2007 et 2015 dans un service de médecine interne
- patients âgés de plus de 65 ans, hospitalisés pour une maladie veineuse thrombo-embolique associée à une affection hématologique

## RÉSULTATS

- 8 cas
- Femme:50% Homme: 50%
- Age moyen: 71ans (66-77ans)
- Le siège de la thrombose veineuse était au niveau:
  - Membres inférieurs : 7cas de siège profond dans 6 cas
- Une embolie pulmonaire : 1cas.
- Facteurs de risque thrombo-embolique (FDR) sont représentés dans le tableau suivant

FDR	Age	Insuffisance veineuse	Chimiothérapie	Obésité	Alitement
%	100%	50%	50%	37,5%	12,5%

- Les **affections hématologiques** retrouvées sont représentés sur la **figure 1**
- Dans 5 cas, L'affection hématologique était déjà connue et les patients avaient reçu une chimiothérapie anticancéreuse avant l'épisode thrombo-embolique
- Dans 3 cas l'accident thrombo-embolique avait révélé l'affection hématologique
- L'évolution sous traitement anticoagulant était favorable dans 5cas.
- Une récurrence de thrombose veineuse profonde était notée dans 1cas.
- Un cas de décès était noté dans un contexte de cachexie et de dénutrition sévère



## Discussion:

La prévalence de la maladie veineuse thromboembolique augmente avec l'âge. Elle représente une complication classique, fréquente d'une hémopathie. Sa prévalence est estimée à 30 % dans les syndromes myéloprolifératifs, à 13 % dans les autres hémopathies malignes dans la littérature(1). Ce qui impose l'importance la recherche active d'hémopathie lors de la découverte d'un événement thrombo-embolique et la nécessité de le dépister et le prévenir si le patient est atteint d'une hémopathie maligne.

## CONCLUSION:

- Du fait de leur action proprement thrombogène ou du fait de la thrombogénicité de la chimiothérapie, les affections hématologiques en particulier les hémopathies malignes, sont accompagnées d'accident thrombo-emboliques pouvant être graves, notamment chez le sujet âgé fragile.
- Dans les limites de notre série, l'association lymphome et thrombose était la plus fréquente